

AL DIRIGENTE DEL 70° CD

Dr. G. MARCHESE

Prot. del

OGGETTO: Prevenzione della diffusione dell'*Enterobius vermicularis* (Ossiuriasi)

L'ossiuriasi è una comune infestazione intestinale, può decorrere in maniera asintomatica o con prurito anale.

Si trasmette per via oro-fecale attraverso le mani o tramite oggetti contaminati.

Le uova dell'ossiuro rimangono infestanti nell'ambiente esterno per due settimane.

SI CONSIGLIA :

di attenersi alle seguenti indicazioni di seguito elencate da adottare con particolare attenzione al lavaggio delle mani dei soggetti affetti, a chi fa loro assistenza al bagno e al consumo dei pasti e ai familiari.

- 1) Usare sempre lo stesso servizio igienico.
- 2) Disinfettare dopo ogni defecazione.
- 3) Lavaggio delle mani prima e dopo i pasti e quando si va in bagno.
- 4) Taglio delle unghie.
- 5) Disinfettare oggetti e biancheria (lavaggio a 60 gradi) con cambio giornaliero per due settimane.
- 6) Sanificare giochi, attrezzi, pavimenti servizi igienici e le superfici su cui vengono consumati i pasti.

NB Tutti gli interventi non sono risolutivi per il contenimento dell'infezione se non associati a diagnosi e terapia dei casi e dei loro contatti.

IL DIRIGENTE SCORRATICO
Gaetano Marchesano

Il dirigente della UOPC